

Aves de Traspatio




¿Qué debo hacer cuando reciba mis aves?

Procurar cuando reciba sus aves que no se encuentren aplastadas en la caja por lo que debe traer 2 cajas grandes para su transporte. Ofrecer agua limpia y fresca suficiente las primeras dos horas posteriormente ofrecer su alimentación normal.

¿Por qué debo tener un gallinero?

Se debe tener un gallinero para proteger a las aves de los depredadores y las inclemencias del tiempo: frío, lluvia, viento, humedad de esta forma las aves se enferman menos. Mejorar su alimentación,

prevenir las enfermedades y darle un manejo que permita elevar rendimientos de producción.



Se debe considerar que por cada 6 aves un metro cuadra como mínimo para su buen desarrollo.

¿Cómo tener una gallina feliz?



- Dar siempre agua limpia y fresca, cambiar dos veces al día.

- Ofrecer una alimentación balanceada, sana y a la misma hora.

- Mantener limpios los comederos y bebederos.

- Barrer diariamente el gallinero

- Cambiar la cama de los nidos una vez por semana.

- Aplicar una mezcla de cal y ceniza donde puedan existir parásitos principalmente en los nidos.

- Recolectar huevos de 2 a 3 veces al día.

- Llevar un programa de vacunación.

¿Qué les puedo dar de comer?

Alimentos concentrados de cualquier marca comercial que sean para aves de postura, así como pueden proporcionar algunos granos como fuente de energía como es el maíz, trigo y cebada ofrecerlos siempre tostados y bien triturados, algunos desperdicios de frutas y verduras, tortillas remojadas, nixtamal, cascarrón molido como fuente de calcio. Pueden también abrir el corral para que salgan a pastorear y aprovechen las plantas nativas que se encuentran en la región como pastos, malva, etc. A demás pueden consumir lombrices de tierra, larvas de mosca, cochinillas, chapulines de temporada, entre otros insectos para complementar la proteína, teniendo


mejores resultados y menos gasto en la alimentación de nuestras aves.

Principales Enfermedades

Newcastle.

Síntomas:

Tos, ahogo, descarga nasal y respiración irritante. Excesiva mucosidad en la tráquea, nubosidad en la córnea y buche hinchado. Inactividad, aglomeración cerca de alguna fuente de calor, parálisis de una o ambas alas y patas, cabeza y cuello torcido. Muchas veces la cabeza se dobla hacia atrás, sobre la espalda o hacia adelante, entre las patas.




Cólera Aviar:

Dejan de comer y beber, perdiendo peso en forma rápida; pudiendo presentarse diarrea de color amarillo verdoso y una marcada caída en la producción de huevos. Puede ocurrir parálisis debido a las inflamaciones de las patas y dedos.



Viruela:

Generalmente aparece como una ampolla o picada de mosquito que forma nódulos y luego se forma una costra. Causa hinchazón de la cresta, carnosidades, la cara, los ojos y en las partes del cuerpo que carecen de plumas.



ISPA. Claudia Verónica Robledo Hernández

Desarrollo Rural y Agroalimentario.
San Francisco del Rincón

Certificado de Capacitación:

Nombre:

Comunidad:
